Universität Leipzig Institut für Informatik Automatische Sprachverarbeitung	Algorithmen und Datenstrukturen II SS 2018 – Serie 2		
Prof. Dr. Gerhard Heyer	Ausgabe am 02.05.2018	Abgabe am 09.05.2018	Seite 1/3

Algorithmen und Datenstrukturen II SS 2018 – Serie 2

5 (4 Punkte) Randomisierte Algorithmen

Ein Objekt x_0 einer Fitness-Landschaft habe die Nachbarn x_1 und x_2 . Die Fitnessfunktion f auf diesen Objekten sei gegeben durch

Objekt x	x_0	x_1	x_2
Fitness $f(x)$	3	2	5

Betrachten Sie einen Metropolis-Walk ausgehend von x_0 .

- a) (1 P.) Sei zunächst $T = 1$. Geben Sie für $y = x_1$ und $y = x_2$ jeweils die in Schritt 2 bestimmte Wahrscheinlichkeit an, mit der der Move $x_0 \rightarrow y$ akzeptiert wird. Berechnen Sie diese auch auf zwei Nachkommastellen gerundet.
- b) (1 P.) Sei nun $T = 4$. Geben Sie wieder die Akzeptanz-Wahrscheinlichkeiten für $x_0 \rightarrow x_1$ und $x_0 \rightarrow x_2$ an.
- c) (2 P.) Wie degeneriert ein Metropolis-Walks in den beiden folgenden Grenz-Fällen
 - i) die Temperatur wird sehr klein (geht gegen 0.)
 - ii) die Temperatur wird sehr gross (geht gegen unendlich.)

Wählen Sie die jeweils passendste Beschreibung unter den folgenden Begriffen "Uniform Random Walk", "Non-Uniform Random Walk", "Gradient-Descent", "Simulated Annealing", "Adaptive Walk". (Erschliessen Sie sich ggf. die Bedeutung der Begriffe.)

6 (5 Punkte) Genetische Algorithmen

Gegeben seien die beiden Individuen x_1 und x_2 .

x_1 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

x_2 : 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Rekombinieren Sie die beiden Individuen durch

- a) 1 Punkt Crossover mit $k=2$
- b) uniform Crossover mit dem Tauschvektor (*, *, *, -, -, *, -, -, -)
* = tauschen
- c) elementweise Mittelwertbildung
- d) elementweise Konvexe Kombination mit $p=0.2$

Welche der verwendeten Selektionsmethoden ergeben eindeutige Rekombinationen?

Universität Leipzig Institut für Informatik Automatische Sprachverarbeitung	Algorithmen und Datenstrukturen II SS 2018 – Serie 2		
Prof. Dr. Gerhard Heyer	Ausgabe am 02.05.2018	Abgabe am 09.05.2018	Seite 2/3

7 (9 Punkte) Ungerichtete Graphen

Gegeben sei der folgende ungerichtete gewichtete Graph G .

- (4 Punkte) Finden Sie einen minimalen Spannbaum von G mit dem Algorithmus von Kruskal wie in der Vorlesung beschrieben. Geben Sie die nach Gewichten sortierte Liste L der Kanten aus und schreiben Sie die Kanten des Baums in der Reihenfolge hin, in der sie hinzugefügt werden. Wenn eine Kante aus L nicht in den Spannbaum aufgenommen wird, so geben Sie den bereits im Spannbaum enthaltenen Pfad an, der die beiden Knoten der Kante verbindet (z.B. Kante $\{1, 2\}$ könnte durch den Pfad $1 \rightarrow 5 \rightarrow 2$ schon enthalten sein).
- (2 Punkte) Ist der in Aufgabenteil a) gefundene minimale Spannbaum eindeutig? Falls ja: begründen Sie dies. Falls nein: wieviele minimale Spannbäume hat G ?
- (3 Punkte) Der Algorithmus von Kruskal werde auf einen nicht-zusammenhängenden gewichteten Graphen $G = (V, E, w)$ mit $n = |V|$ Knoten angewendet und liefere eine Kantenmenge T mit $r = |T|$ Kanten. Ist (V, T) ein Spannbaum von G ? Begründen Sie ihre Aussage. Bestimmen Sie die Anzahl der Zusammenhangskomponenten z_k von G .

8 (7 Punkte) Gerichtete Graphen

Ein gerichteter Graph sei durch seine Kantenliste gegeben:

5, 8, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 3, 4, 4, 2, 4, 5, 5, 3,

- Geben sie die Adjazenzmatrix des Graphen an. Folgen Sie genau dem in der Vorlesung vorgestellten Vorgehen. (1 Punkt)
- Zeichnen sie den Graphen. (1 Punkt)
- Besitzt dieser Graph einen Hamiltonschen Zyklus? Falls ja: Geben Sie einen an. Falls nein: Begründen Sie dies möglichst kurz. (1 Punkt)

Universität Leipzig Institut für Informatik Automatische Sprachverarbeitung	Algorithmen und Datenstrukturen II SS 2018 – Serie 2		
Prof. Dr. Gerhard Heyer	Ausgabe am 02.05.2018	Abgabe am 09.05.2018	Seite 3/3

d) Betrachten Sie die Knotenfolgen

(1,2,3,4,5,3,4,2), (1,4,5,3,1), (1,2,3,4,5), (3,4,5,3)

Geben Sie zu jeder Knotenfolge an, ob sie für den gegebenen Graphen

- ein Weg
- ein Spannbaum
- ein Pfad
- ein Zyklus

ist. (4 Punkte)